

Excisie (het wegsnijden van een huidafwijking)

Mohs Klinieken Dordrecht

Spuiboulevard 226
3311 GR Dordrecht
T: +31 (0)78 632 10 80
F: +31 (0)78 632 10 81
E: contact@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Amsterdam

Claude Debussylaan 263-265
1082 MC Amsterdam
T: +31 (0)20 820 11 95
F: +31 (0)20 820 21 86
E: contactamsterdam@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Mohs Klinieken Noord Holland

Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T: +31 (0)229 820 256
F: +31 (0)229 820 257
E: contactnh@mohsklinieken.nl
I: www.mohsklinieken.nl

Excisie (het wegsnijden van een huidafwijking)

In deze informatiefolder wordt uitgelegd hoe de ingreep verloopt, wat de te verwachten resultaten en de mogelijke risico's zijn en enkele leefregels voor de periode na de ingreep.

Wat is het

Huidafwijkingen kunnen op diverse manieren worden verwijderd. Een van de meest toegepaste vormen is de excisie. Hierbij wordt de huid met de afwijking weggesneden en gehecht.

Hoe verloopt de ingreep

De ingreep (excisie) gebeurt in de behandelkamer.

U neemt plaats in een comfortabele operatiestoel. Er wordt samen met u het juiste plekje aangewezen. Na het ontsmetten van de huid wordt plaatselijke verdoving gegeven. Dit kan gevoelig zijn. De dermatoloog snijdt het stukje huid weg. Mogelijk worden er enkele bloedvaatjes dichtgeschroeid. Nadien wordt er gehecht. Dit kan door de wondranden eenvoudig samen te brengen. Indien dit niet mogelijk is, zal er huid van elders gebruikt worden; dit kan door huid te schuiven, of door het van een andere plaats te transplanteren. Soms wordt het defect niet gesloten en laten we het spontaan genezen.

Welke techniek gekozen wordt, gebeurt in overleg met u. Daarna wordt de wond verbonden.

Het resultaat

Na iedere ingreep ontstaat er een litteken. Hoe dit eruit komt te zien, hangt af van de plaats waar geopereerd wordt, uw eigen genezingsaanleg en de operatietechniek. Bent u niet tevreden over het uiteindelijke resultaat, neem dan contact op met de arts en deze zal samen met u naar een oplossing zoeken.

De risico's

Het risico op een ernstige complicatie is minimaal.

Indien u allergisch bent voor verdovingsvloeistof, dient u dat steeds te melden.

Nabloeding

Er komt bloed onder het verband uit. Duw met de vlakke hand gedurende 20 minuten continue stevig op het verband. Indien het bloeden niet stopt, duwt u opnieuw 20 minuten op het verband zonder los te laten.

Indien het blijft bloeden, neemt u met ons of met uw huisarts contact op.

Infectie

Als na enkele dagen het geopereerde gebied pijn gaat doen of rood gaat zien of u krijgt koorts, neem dan s.v.p. contact op met ons.

Als het litteken dik wordt of er niet mooi uitziet, maakt u dan een afspraak met uw dermatoloog in Mohs Klinieken.

Enkele leefregels voor na de operatie

- Doe rustig aan; til geen zware zaken, buk niet vaak naar voren, doe niet aan sport
- Laat het verband zitten tot de hechtingen worden verwijderd, tenzij het erg vies of nat geworden is
- Maak het verband niet nat! Dit verhoogt de kans op infecties.

April 2013



zkn
ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND
KEURMERK