

# Bovenooglidcorrectie

## **Mohs Klinieken Dordrecht**

Spuiboulevard 226  
3311 GR Dordrecht  
T: +31 (0)78 632 10 80  
F: +31 (0)78 632 10 81  
E: [contact@mohsklinieken.nl](mailto:contact@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## **Mohs Klinieken Amsterdam**

Claude Debussylaan 263-265  
1082 MC Amsterdam  
T: +31 (0)20 820 11 95  
F: +31 (0)20 820 21 86  
E: [contactamsterdam@mohsklinieken.nl](mailto:contactamsterdam@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## **Mohs Klinieken Hoorn**

Maelsonstraat 26  
1624 NP Hoorn  
T: +31 (0)229 820 256  
F: +31 (0)229 820 257  
E: [contactnh@mohsklinieken.nl](mailto:contactnh@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## ***Bovenooglidcorrectie***

Door veroudering, erfelijke aanleg en leefstijl kan uw huid en/of spieren rondom uw ogen gaan verslappen. U kunt er daardoor vermoeid en ouder uit gaan zien. Door het wegnemen van het teveel aan huid, en soms ook spier- en vetweefsel, krijgt u weer een frisse open blik.

### ***Hoe verloopt een bovenooglidcorrectie?***

Allereerst wordt het teveel aan huid secuur afgetekend. De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving, welke met een dun naaldje wordt ingespoten. Hierna wordt de overtollige huid, en soms ook spier- en vetweefsel, verwijderd. Als laatste wordt de huid gehecht en de bovenoogleden worden verbonden. De hechtingen worden na 1 week verwijderd.

### ***Kunnen hangende bovenoogleden altijd met een bovenooglid correctie behandeld worden?***

Nee. In sommige gevallen maskeert een huidteveel aan de bovenoogleden een laagstand van de wenkbrauwen. Het kan zijn dat u dan beter geholpen bent met een wenkbrauwlift. Dit is een ander type ingreep, die wij niet uitvoeren.

### ***Hoe lang duurt een bovenooglidcorrectie?***

Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats waarin uw wensen en verwachtingen besproken worden, alsmede de mogelijke behandelresultaten. De behandeling zelf neemt over het algemeen niet meer dan 45 minuten in beslag.

### ***Is de behandeling pijnlijk?***

De pijn valt meestal erg mee. Zo nodig mag u paracetamol innemen.

### ***Moet ik voor de behandeling speciale voorzorgsmaatregelen treffen?***

De ochtend van de operatie gewoon douchen/wassen zoals u gewend bent. U kunt uw eigen dagcrème aanbrengen, maar geen make-up.

Indien u bloedverdunders slikt, is het beter om deze een aantal dagen voor de operatie te staken. Ascal ( acetylsalicylzuur) 1 week van te voren en acenocoumarol of sintrommitis 3 dagen voor de ingreep. In geval van twijfel overlegt u met de arts die u de bloedverdunders voorschrijft. De dag na de operatie mag de medicatie weer ingenomen worden. Als u griepig bent of verkouden, is het beter de operatie uit te stellen. Door hoesten en niezen kunnen bloedingen ontstaan.

Indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een actieve infectie van de huid heeft (koortslip, krentenbaard) dan stellen we de behandeling uit.

## ***Nazorg en leefregels:***

Na de ingreep zwellen de oogleden tijdelijk flink op en zijn ze gevoelig. Ook is het mogelijk dat er blauwe verkleuring (een bloeduitstorting) ontstaat. De zwelling is meestal de dag na de ingreep het heftigst en zakt daarna langzaam af. Om de zwelling tegen te gaan adviseren wij om de oogleden te koelen in de eerste 24 uur na de operatie. Dit kunt u doen met cool-packs of door twee boterhamzakjes voor de helft met diepvries erwten te vullen en deze vervolgens aan elkaar te knopen. De zakjes legt u dan op een gaasje over de oogleden. Ook is het verstandig om op een extra kussen te slapen zodat u minder plat ligt. De meeste zwelling is na 1 week afgezakt, maar het kan wel 6 weken tot 3 maanden duren voordat de zwelling volledig verdwenen is.

Wij adviseren om minimaal 1 week niet te werken en 2 weken niet te sporten. Oog make-up mag na twee weken weer gebruikt worden.

## ***Bijwerkingen en complicaties***

Complicaties bij bovenste ooglidcorrectie zijn zeer zeldzaam! De meesten zijn niet ernstig en verdwijnen vanzelf. De mogelijke bijwerkingen of complicaties van deze ingreep zijn:

- langer aanhoudende zwelling van de oogleden. Dit kan het gevolg zijn van een bloeding of door oedeem (wondvocht)
- het oog sluit (tijdelijk) niet meer volledig (medische term: lagophtalmus). Dit kan een gevolg zijn van de zwelling na de operatie, of als gevolg van het wegnemen van teveel huid. Meestal verdwijnt dit in de loop van weken. Wel is het belangrijk om de oogbol goed vochtig te houden met ooggel of zalf
- een infectie. Dit is zeer zeldzaam. Als in de dagen na de ingreep de pijn toeneemt, er koorts optreedt met roodheid en zwelling van het gebied, neemt u dan contact met ons op. Het kan noodzakelijk zijn dat u antibiotica voorgeschreven krijgt
- droge ogen. Komt vaker voor bij mensen die hun ogen hebben laten laseren. Dit kan behandeld worden met kunst-tranen (Ly-tears of Dura-tears)
- een asymmetrie van de bovenoogleden. Soms wordt aan het ene ooglid niet precies evenveel weggenomen als aan het ander. Soms bestaat er voor de ingreep al een asymmetrie. Het is altijd mogelijk om deze te corrigeren met een nieuwe ingreep
- een bloeding in de oogkas (medische term: retro-bulbair hematoom). Dit is zeer zeldzaam, maar kan optreden in de eerste 24 uur na de operatie. Indien u na de operatie in toenemende mate last krijgt van pijn en zwelling aan een kant, gepaard gaande met een verminderd gezichtsvermogen, dient u direct contact met ons op te nemen.

Augustus 2015



**zkn**

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND  
KEURMERK