

# Verwijdering van spataderen via ambulante flebectomie (Muller techniek)

## **Mohs Klinieken Dordrecht**

Spuiboulevard 226  
3311 GR Dordrecht  
T: +31 (0)78 632 10 80  
F: +31 (0)78 632 10 81  
E: [contact@mohsklinieken.nl](mailto:contact@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## **Mohs Klinieken Amsterdam**

Zwaansvliet 5  
1081 AP Amsterdam  
T: +31 (0)20 820 11 95  
F: +31 (0)20 820 21 86  
E: [contactamsterdam@mohsklinieken.nl](mailto:contactamsterdam@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

## **Mohs Klinieken Hoorn**

Maelsonstraat 26  
1624 NP Hoorn  
T: +31 (0)229 820 256  
F: +31 (0)229 820 257  
E: [contactnh@mohsklinieken.nl](mailto:contactnh@mohsklinieken.nl)  
I: [www.mohsklinieken.nl](http://www.mohsklinieken.nl)

# ***Verwijdering van spataderen via ambulante flebectomie (Muller techniek)***

## ***Inleiding***

De ideale behandeling van spataderen hangt af van verschillende factoren. Spataderen kunnen worden behandeld door middel van laser, spuiten of operatie zoals de ambulante flebectomie (Muller techniek). Voor middelgrote spataderen die teruggekomen zijn na een eerdere operatie is de ambulante flebectomie vaak de meest aangewezen behandeling. Deze behandeling kan in combinatie met de andere behandelingsmogelijkheden worden toegepast. Deze behandeling wordt bij bepaalde medische indicaties vergoed door uw zorgverzekeraar.

## ***Vooraf***

- Wanneer u bloedverdunders gebruikt, mag u voorafgaande aan de behandeling de bloedverdunnende medicatie blijven gebruiken (zoals Sintrom (acenocoumarol), marcoumar of andere bloedverdunders). Vermeld wel aan de behandelend arts dat u bloedverdunders gebruikt.
- Wilt u op de dag van de behandeling geen crème of lotion gebruiken op het been dat behandeld wordt? Dit voorkomt dat de pleisters loslaten.
- Wij adviseren om het te behandelen been 2 dagen voor de behandeling te scheren omdat er steriele groene doeken met kleefstrips aan uw been worden geplakt. Het verwijderen van deze kleefstrips kan bij beharing pijnlijk zijn.
- Denkt u er aan geen strakke kleding te dragen op de dag van de behandeling.

## ***Hoe verloopt de ingreep?***

De ingreep ongeveer 30 minuten, maar met alle voor- en nazorg inbegrepen, kunt u gemakkelijk op een uur rekenen. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

U meldt zich aan de balie en als u aan de beurt bent begeleidt de assistente u naar de behandelkamer. Daar maakt u uw benen helemaal bloot. Vervolgens zal de arts de te behandelen aderen aftekenen, waarna u mag gaan liggen. Het gebied wordt ontsmet en steriel afgedekt met doeken. Daarna wordt de huid plaatselijk verdoofd door middel van verdovingsinjecties.

Vervolgens worden er kleine sneetjes gemaakt van ongeveer 2-3 mm en wordt de spatader via deze sneetjes met een speciaal haakje eruit gehaald. Meerdere centimeters spatader worden zo per sneetje verwijderd. Er zullen kleine stukjes spatader achterblijven. Deze vormen gevoelige "bobbels" maar verdwijnen in de loop van weken tot maanden. Het aantal sneetjes hangt vooral af van de lengte van de spatader.

Na de behandeling worden de sneetjes bedekt met een hechtpleister (er zijn geen hechtingen nodig) voor het mooiste cosmetisch resultaat.

Er worden wattenrolletjes over het behandelde deel geplakt voor extra druk, daaroverheen wordt soms een kleefverband aangebracht dat 2 dagen moet blijven zitten.

Na 2 dagen mag het verband eraf en draagt u de therapeutisch elastische kous gedurende minimaal 1 week alleen overdag. 's Nachts doet u de kous uit.

### ***Na afloop van de behandeling***

Nadat de verdoving is uitgewerkt (ongeveer 4 uur na de behandeling) kan het behandelde gebied gevoelig zijn.

Pijnstillers zijn meestal niet nodig. Het gebruik van paracetamol is toegestaan (maximum 2 x 500 mg elke 8 uur). Uw been kan bont en blauw zien na de behandeling. Dit trekt over het algemeen na een dag of 10 spontaan weg. Soms kan er een nabloeding optreden. Omdat dit meestal gebeurt vlak na de behandeling verzoeken wij u om nog even (ongeveer 30 minuten) in Mohs Klinieken aanwezig te blijven na de behandeling.

Het is aan te raden niet zelf naar huis te rijden.

Mocht er thuis wat bloed door het verband lekken dan kunt u het beste uw been omhoog leggen en op de plek druk geven waar het bloed doorsijpelt. Indien u het niet onder controle krijgt neem dan direct contact op met Mohs Klinieken of uw huisarts.

Twijfelt u ergens over of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Mohs Klinieken.

